


Lu 2 fois


par Duboutrand
 Mémoire sur les accidens fâcheux des
 des fractures les plus simples en apparence



Il y a des fractures si compliquées qu'on n'est pas étonné de voir des blessés ne pouvoir résister aux accidens qu'elles occasionnent, malgré les soins les plus attentifs, et les mieux combinés; mais il doit paraître paraitre étonnant que des fractures simples en apparence aient quelque fois la terminaison la plus fâcheuse. L'expérience m'a fait voir des cas de cette nature; et j'écris avoir été assez heureuse pour en découvrir la cause.

Des fractures très simples, éloignées des articulations, réduites, faisant toutes les règles de l'art, maintenues méthodiquement par les bandages ordinaires, ont donné lieu au bout de quelques jours à des accidens fâcheux tels que la fièvre, le délire, les convulsions, et enfin la mort, quoi qu'il ne parût aucun désordre, pas même le moindre dévangement à la partie blessée; c'est ce que j'avais mis sous les yeux de l'Académie par plusieurs Lettres de pratique que j'ai eu l'honneur d'appeler à l'attention pour leur être communiquées.

1 observation

Un manon fut transporté à l'hôtel Dieu en 8 br 1767, il venoit de se casser la jambe gauche à deux grands travers de doigt au dessus de la tubérosité du tibia; ce blessé qui avoit environ 30 ans fut saigné deux heures après, et saigné deux fois dans le 24 heures pour prévenir les accidens. il parut assez tranquille jusqu'au 3 jour qu'il eut de petits frissons, et de la fièvre. le délire survint le 3 au soir. le 6 au matin on leva l'appareil qu'il ne parut en rien gêner la partie; on ne trouva qu'une légère ecchymose et un léger gonflement aux environs de la fracture. on réappliqua un nouvel appareil avec toute l'attention possible, et le blessé fut saigné au pied; les convulsions et le délire augmentèrent dans la journée.

ARC52

n° 20

2
Dans la journée, enfin il mourut du 6. au 7. —
Dès le matin, instruit de sa mort, j'ouvris la jambe pour découvrir
la fracture; les pièces étoient déplacées par l'effet du transport à
la salle des morts; il n'y avoit pas d'erguilles, la fracture étoit près
que transversale; mais j'observai le canal médullaire d'un rouge
brun, il étoit enfoncé partout dans la portion supérieure; l'infé-
rieure avoit conservé une sorte de consistance, j'introduisis une
sonde cannelée, je la retirai avec cette apparence sans odeur.

II Observation

Trois mois après environ on transporta à l'hôtel Dieu
sur les 4 heures du soir un blanchisseur qui venoit de se casser ^{à la cuisse}
vers la partie moyenne; j'étois alors de garde, la fracture
~~ne~~ étoit simple, le malade avoit 35 ans, il étoit robuste,
nous le pausâmes feu Monsieur Dabut et moi: il fut saigné
deux fois dans la nuit. Sur le soir du 2^{me} jour de son accident
il commença à se plaindre d'une douleur aiguë qui s'étendoit
le long de la cuisse, et de la jambe; on leva l'appareil, les parties
étoient en bon état et nullement gênées. Le 3^{me} jour il fut re-
saigné à cause de la continuation de la douleur. Le 4^{me} la fièvre
survint avec un léger frisson; on l'attribua à des poires cuites
qu'il avoit mangées: on le mit à une diète sévère et à l'usage d'un
saucrimetis.

Le 5. mêmes accidents, même régime mêmes remèdes —

Le 6. la fièvre augmenta il eut quelques légers mouvements
convulsifs et des frissons momentanés. (C'est alors que me rap-
pellant la mort du blé qui est le sujet de ma 1^{re} observation,
j'épiai tous les accidents; on donna des anti-spasmodiques on leva
l'appareil au pausement du soir, et tout du côté de la fracture
paroissoit en bon état. L'appareil fut réappliqué avec tout le
ménagement possible.

Je proposai alors à Monsieur Dabut mes doutes sur l'altération
de la moelle

de la moëlle; d'après ce que j'avois observé dans le blessé, mais il n'eût pas
 à cette cause l'accident consécutif, sachant que les piéces étoient bien affrontées
 et la fracture tant simple. Il n'y eut donc rien de remarquable. Cependant par suite de l'inflam-
 mation, et la fonte putride de la substance médullaire ne peuvent produire
 des accidents mortels, puis qu'il m'est arrivé plusieurs fois, mais que
 n'étant dans des fracs d'os, ou elle se trouvoit piquée par des esquilles, ou par les
 piéces mal affrontées, et qu'à lors il y avoit un gonflement douloureux, inflam-
 mation de toute la portion de de qu'il avoit même ouvert dans ces cas la fracture
 pour ôter les portions d'os détachées; mais que ces opérations étoient
 toujours sans succès, et qu'après la mort il avoit trouvé la moëlle en suppu-
 ration. Il jugea qu'à notre malade actuel les accidents dépendoient de
 toute autre cause.



Comme je n'avois qu'un soupçon sur l'altération de la moëlle, je n'en
 n'existait pas; j'proposai la saignée au pied qui fut faite, et une potion
 antispasmodique. La nuit on vint m'appeller et je la trouvai dans
 un accès de convulsion semblable à celle de l'épilepsie; l'ong qu'il fut
 parti je fis vider la tête pour observer si il n'y avoit pas quelque contusion
 ou douleur locale; il n'y avoit rien. Cet homme mourut le 25 dans
 la matinee; j'en instruisis M^r Dubut, et le fis transporter devant
 moy à la salle des morts sans déranger l'appareil, afin qu'on pût
 mieux voir l'état des choses. Nous ouvrimus la crâne dans toute
 sa longueur; nous trouvâmes un léger échauffement, qui malgré
 mon attention, nous parut être l'effet du transport; mais qu'on
 eût à peine pu distinguer au toucher.
 La fracture avoit un peu d'obliquité; la substance médullaire
 étoit en fonte putride; nous ne trouvâmes rien d'extraordinaire
 dans la portion; dans la tête, le plexus choroïde étoit variqueux
 et les ventricules innombrables d'une matière puriforme; il y en avoit aussi
 sous la dure-mère.

À quoi donc attribuer la cause de ce désordre dans le cerveau?

est-elle idiopathique? il n'y avoit nulle apparence, puis que le malade étoit tombé simplement sur la cuisse, étant chargé d'une botte de linge, et que la tête n'avoit pas porté; elle étoit donc sympathique, puis que les accidens ont communément se montrer dès le 4^{ème} jour de la blessure; mais d'où dépendoient les accidens? étoit-ce du fracas des os, et de la meurtrissure des chairs qui auroient occasionné cause une prompte mortification? non certainement, car la fracture étoit des plus simples en apparence, et qui après l'ouverture de la partie, on a trouvé que la moëlle étoit en fonte putride: c'étoit donc très probablement l'altération de cette substance, dont les miasmes putrides avoient été transportés dans la masse générale des humeurs, et qui après avoir fait stase dans le cerveau, ont occasionnés tous les accidens.

D'après ces deux observations bien réfléchies, ne devoit-on pas, en pareille circonstance, s'écarter de couvrir sur la fracture par une incision comme on fait en ces plaies ou fortes contusions de la tête. Lorsque les accidens y déterminent, car (comme je le répète encore) il y a tout lieu de croire que les accidens qui surviennent dans ces cas, et qui ont causé la mort, ont les effets de la commotion de la moëlle, et de son altération. Car en supposant comme j'ai vu, la fracture simple, les articulations voisines libres, les pièces bien approuées, la situation et le bandage réglant aucunement, le malade très sain, et qui après l'ouverture des cadavres j'ai reconnu la moëlle fondue et putrifiée dans le canal médullaire, ne puis-je pas en avoir de croire qu'ils n'ont prévus que de la suite de la résorption de cette substance putrifiée, et que si d'une part y a un moyen de conserver les blessés dans cette circonstance, c'est d'avoir sur la fracture, désuoir même les pièces pour donner issue à la moëlle altérée, comme on a souvent fait avec une foret qu'on a pourvue, ou reconnue l'altération du diaplôe, ou si l'on veut une ponction sur la dave-maine.

5

Ces circonstances sont abrévité très embarrassantes; on peut les comparer à celles dont parle Monsieur Quesnay dans son ouvrage sur les trièpres dans les cas douteux, où il dit que les plus grands maîtres ne savent quel parti prendre pour traiter certains coups à la tête sans lésion sensible de l'os, souvent sans plaie, et sans contusion apparente des chairs, les quels causent quelque fois, des épanchemens sous la crâne, d'autre fois n'en causent pas, quoi qu'ils soient accompagnés de circonstances et d'accidens qui donnent lieu à la suppuration. il y a alors des praticiens qui se déterminent à trièpres, d'autres se contentent de combattre les accidens: les uns et les autres réussissent souvent, mais souvent aussi ils se trompent. enfin il me chut par dire que toutes les fois que dans des cas douteux, les accidens se soutiennent, on doit se déterminer au trièpres, Comme je vois, dans le cas que je propose, qu'on doit se déterminer à ouvrir sur la fracture, en débrider les pièces pour donner issue à la matière altérée.

III^{me} Observation



On porta le 5. 7^{bre} 1774, à l'infirmerie de S. A. S. M^{gr} le prince de Conty un de ses fourgonniers âgé d'environ 50 ans. il venoit de se casser la cuisse à la partie moyenne un peu inférieure. La fracture étoit simple et transversale; je la réduisis avec facilité, et la maintins en situation avec l'appareil suivant

- 1^o je placai une compresse en plusieurs doubles et ferdis au lieu de bandage à 18 chefs.
- 2^o une autre compresse double en long sur la fracture,
- 3^o deux gouttières de carton d'environ 8. pouces de long à chaque partie latérale de la cuisse, que j'avois préalablement trempées dans des blancs d'œufs battus, et avec de l'eau de vie pour qu'elles se moulassent mieux à la partie, le tout retenu avec trois rubans de fil modérément serrés;

6
Et des faux faus; j'ai donné au membre une situation légèrement
étendue.

L'expérience m'a fait préférer ce simple appareil au bandage roulé
à celui à 8 chefs, parce que 1° par son moyen on pousse le bras, l'on
examine ce qui se passe à la fracture autant de fois qu'il est nécessaire
pour s'assurer le membre et sans occasionner de douleur, 2° parce que si
il survient du gonflement (comme cela arrive quelque fois) la garde
malade, ou autre personne, peuvent se toucher les vultures, écarter
un peu les cartons, mettre par conséquent le malade à l'aise sans
déranger les pièces fracturées ni la situation, et attendre sans
danger l'avis du chirurgien; ce qu'il ne pourroit faire
surtout avec le bandage roulé qui, avec cet inconvénient, joint
encore ceux, 1° d'obliger de faire tenir la partie long-temps étendue
(lors de son application) par des aides qui sont dans une situation très
gênante, 2° qui à chaque mouvement qu'ils font dérangent les
pièces et causent des douleurs au malade. 3° que chaque tour de
bande occasionne les mêmes inconvénients, 3° enfin que ce bandage
étant appliqué les muscles de la partie sont constamment comprimés,
dans toute leur étendue; de là, la gêne la douleur, le gonflement ^{+ de la circulation,}
ce que le pansement simple que j'emploie ne peut occasionner; et de
plus, les sucs qu'on a souvent obtenus dans les fractures compliquées,
de plaie, de convulsion, &c pendant le traitement desquelles on
n'a pas employé de bandes, qui cependant on baigneries, et bien
conservé la direction de la partie.

(Mon père en a un exemple très frappant)

Le bras fut saigné trois fois dans les 24 heures, et mis au
régime convenable: tout alloit bien jusqu'au 13^e jour que
la femme (ayant appris son accident) vint de Lisle à Paris
s'efforcer par les suites de son malheur qui disoit elle pourroit
lui faire perdre sa place.

Lancet d'eut un peu de fièvre, venant de la douleur qui s'étendait
le long de la cuisse comme le Blanchisseuse dont j'ai parlé. je le saignai
le 6^{ème} au matin, et n'observai point de gonflement ny rien qui pût faire
soupçonner que l'appareil fût cause de ces accidents. Le délire survint
sur le midi; je me disposois à lui faire une saignée au pied lorsque
M^r Guerin le jeune arriva de l'hôpital de la part du prince
pour savoir des nouvelles du blême: il ne fut pas d'avis de la saignée
ny même de la levée de l'appareil, disant que ce qui le provoquait
n'était produit que par les mauvais propos de la femme.
Cependant les accidents ayant augmentés sur le soir la saignée
fut faite, et je levai l'appareil en sa présence, et allai de
mon père pour voir ce qui se passait. Il n'y avait ny rougeur
ny tumeur, ny contusion, et les pièces étoient bien maintenues.
M^r Guerin proposa cependant le bandage roulé, & à quel
jeune eus obligé d'obtempérer; mais ce fut fait avec bien du
ménagement.



Nous tirâmes un mauvais pronostic: le malade devint
sévère pendant la nuit; défist son appareil de
son meubla; je trouvais les pièces dérangées, je ne fis autre chose
que de le faire retenu dans son lit, et lui fis mettre la cuisse sur
une oreiller naturel par trois liens; et ce qui est bien à remarquer
et ce que je conclus très aisément d'après ce que j'avois observé
dans les deux cas précédents, c'est que depuis que les pièces
n'étoient plus affrontées les accidents se calmèrent.

Le 7^{ème} je proposai de faire une incision sur la fracture, qui
n'auroit pu nuire au blême supposé que les accidents n'eussent
pas dépendu de l'altération de la moëlle, & qui, probablement
lui auroit été très utile si ils en eussent été l'effet. Comme
je le soupçonnais

je le soupçonnais; mais le malade et ses parents s'y opposèrent.
 Et comme il paraissait tranquille, on jugea à propos de temporiser
 nous laissâmes la partie à l'air, et sans bandage quelconque.
 Le 8^{me} même état, la cuisse était dans la même situation, et
 nous toujours dans l'espérance de rétablir la bonne conformation
 au 1^{er} moment. Le 9^{me} la douleur s'étendit, dont le malade se
 plaignoit, se fixa principalement à l'endroit de la fracture
 on y sentit une chaleur brûlante, de la pulsation, et une
 tumeur circonscrite: nous y appliquâmes un cataplasme fait
 avec la pulpe des herbes emollientes, et de l'onguent de saignée
 sur le centre, pour déterminer le dépôt; et je fis avertir Mr
 Guérin pour voir l'état des choses. (mais il ne vint que le
 lendemain matin) le malade passa une très mauvaise nuit,
 la fièvre s'alluma, il eut des frissons irréguliers, et des horri-
 pilations; en fin il mourut le 10 à 6 heures du matin dans
 une espèce de Tétanos.

J'ouvris la tumeur deux heures après la mort, en présence
 de Mr Guérin et de mon père. J'en sortit à peu près une
 cuillerée de matière très fétide de couleur et de consistance
 de lie de vin, la moëlle était en fonte putride dans toute
 l'étendue du canal tant au dessus qu'au dessous de la fracture.
 Je suis très persuadé que, si j'eusse été appelé entreprenant,
 ou au moins appelé libre pour prendre sur moi de faire une
 l'incision sur la fracture dès le 6^{me} jour, nous aurions pu sauver
 le malade; l'orage funeste ne dépendait sûrement pas de la
 crainte ou la femme l'avait jeté; mais suivant moi, de
 l'altération du canal médullaire; et le soulagement qu'il
 a ressentit.

2

qu'il a remuée depuis que dans la fracture l'os s'est démembré les bouts fracturés, ne semble-t-il pas prouver que leur très exact reunion s'opposoit à l'issue de la moëlle altérée? Donnait lieu à la resorption, et à tous les accidents qui en ont été les suites.

L'observation suivante montrera une fracture compléte et très compliquée, dans laquelle la moëlle a souffert altération, dont le blessé est guéri.

IV. observation



Le 15 may 1715 on transporta à l'infirmerie de S. ci. S. monseigneur le prince de Conty un de ses cochers qui, deux heures avant, conduisoit un charriot dont la barre de devant, et qui le soutenoit, s'échappa; étant la jambe prise entre les deux pièces qui composent l'avant-train, pendant que les chevaux courtoient, et n'étant plus guidés faisoient des mouvements de droite à gauche: la jambe fut brisée à la partie moyenne et inférieure, elle étoit antérieurement en angle moussu, et étoit prodigieusement gonflée, et de couleur plombée; les chairs de toute la surface interne machées: il y avoit antérieurement une plaie par laquelle sortoit une portion aigüe du bout supérieur du tibia de la longueur d'un pouce et demi; les environs de la plaie qu'il avoit faite cette pièce d'os, étoient déchirés.

je fis coucher le malade, et fus obligé pour mettre la jambe en situation de faire une incision longitudinale qui commençoit à deux pouces au dessus de la plaie, et se terminoit à trois pouces au dessous; en sorte qu'en y comprenant la plaie, elle avoit environ six pouces de longueur. Cette opération me donna la facilité d'étendre la jambe, et d'examiner le désordre. je trouvois d'abord deux pièces d'os du bout inférieur du tibia qui étoient

10
qui étoient séparées, je les tirai; j'en fis une troisième qui étoit
mobile, mais comme elle étoit en place, je ne crus pas devoir en faire
l'extraction.

La perone qui étoit fracturée à la même hauteur ne me présentait
aucune pièce séparée. je garnis la plaie de charpie sèche, je
passai sous la fracture une compresse en plusieurs doubles, fendue
et imbibée d'eau de vie camphrée. J'appuyai avec de l'eau commune
une autre en long sur la fracture imbibée de la même liqueur.
J'enveloppai la jambe dans un drap roulé en faux fanon, et la
mis dans une situation légèrement fléchie sur un oreiller de
paille d'avoine.

Je ne saignai pas le blessé parce qu'il venoit des matières par
haut & par bas; je lui prescrivis pour la nuit qui fut
orageuse une saignée oblique légèrement écartée, ce qui
produisit des évacuations.

Le lendemain 2^{me} il eut de la fièvre, il commença à délirer.
il fut saigné deux fois depuis qu'il de l'aide de poulet et
émulsionnée. j'ajoutai la partie avec de l'eau de vie camphrée,
Carpie avec partie égale d'une décoction de Kinkina, après
avoir bien examiné l'état de la fracture, et si il n'y avait
pas encore quelque pièce d'os qui occasionna les accidents.
Cependant ils continuèrent toute la journée, et le soir la
plaie étoit dans un très mauvais état, les bords étoient
noirs (c'est-à-dire comme je l'ai observé que la peau et les
muscles étoient machés). L'extrémité aiguë de la portion
supérieure du tibia, et qui avoit, sortoit d'un pouce et demi,
étoit près que recouverte par le gonflement; on ne pouvoit
tentar la moindre extension pour augmenter les accidents.
Je poussai le blessé comme la nuit; la nuit fut aussi orageuse
que la précédente.

Le lendemain 3^{me} même accidents, même régime. 2

il est certain qu'en regard a l'état des choses on auroit dû procéder
a l'opération; mais les accidents la contraignirent.
Le 4^{me} La fièvre le calma, la connaissance vint, la plaie
s'humecta, la pièce de la partie inférieure de tibia se détacha
je la retirai facilement. La portion supérieure et pointue de
cet os repaîtroit alors de plus en plus; les pièces supérieures ne
s'avançoient point dans cet endroit; je suis certain qu'il étoit
aussi fracturé plus haut, mais il n'étoit pas possible de tenter
aucun moyen de s'en assurer.

L'affaire étant grave, j'en conférois avec mon père, qui me
conseilla de prier Monsieur Guerin Laine chirurgien de
provincie de venir nous donner son avis. Il proposa tout de suite
la machine de Mr Maupillier; je lui représentai que j'en
craignois l'application même la plus ménagée, sur tout dans
le cas dont étoit question, parce que la moindre gêne que
le malade éprouvoit lui causoit beaucoup de douleurs et
même des convulsions. Monsieur Guerin insista, en posta au
provincie qui donna des ordres en conséquence.

Mr Maupillier vint le même jour accompagné de son
Gibet ^{son} chirurgien, très instruit dans la mécanique; d'ailleurs
l'osambe fracturée dans la machine en notre province.

Mr Maupillier nous promit de venir le lendemain à la même
heure, et je priai fort Monsieur Guerin de se joindre, sur le soir,
car je craignois beaucoup pour la nuit.
un quart d'heure après que nous l'eûmes sorti, le malade commença
à se plaindre fort haut; j'en suis venu à son secours que deux heures
après: l'insolence de la douleur l'avoit forcé (malgré l'usage
des présentations et même la résistance des infirmiers, et de deux
des camarades de de l'œuvre les liens, veltcher des secours; les
agitations convulsives et le désespoir dans les yeux, je le tenais; nés



* privilège

m'obligeant de tout ôter, et de vi' appliquer tout simplement mon
appareil. le calus succéda bientôt; Monsieur Guerin qui vint
le soir fut convaincu qu'il falloit amener le premier jour éviter
toute gêne. je me contentai d'appliquer sur la plaie un pommade ou
imbibé de vin miellé, un emplâtre d'onguent de stivax, des compresses
trempées dans l'eau de vie Camphrée couvrée avec une decoction de
quinquina, le tibia retenu par des fausses sangles, et je donnai
la partie une situation légèrement fléchie; je prescrivis quatre
vers par jour d'un oporine fébrifuge. Ces médicaments tant
internes qu'externes furent continués pendant trois semaines
environ. j'observois soigneusement de tenir la jambe et le pied
dans une position qui ne gênât aucun le blessé; j'ai consulté
même pour cela.

Le 6. il se plaignit d'une douleur tiraillive qui s'étendoit depuis
le coude du pied jusqu'à la fracture; je m'occupai de chercher
la cause; les deux malléoles ~~étaient~~ dans leur situation, la
partie inférieure du tibia ne présentait ni enqvide, ni apperté,
il n'y avait pas d'étranglement. L'appareil ne gênait pas la partie;
je ne changeai rien à ma conduite.

Le 7. je sciai la portion supérieure et forte du tibia, par
ce malgrés ma attention, elle s'attendrit de jour en jour, et devint
devenir nuisible; les douleurs vers l'articulation augmentoient
beaucoup, et je ne pus trouver la cause de cet accident dans l'at-
tention de la mielle qui ne paraît en fonte putride.

J'introduisis dans le canal osseux de la partie inférieure, et sans que
le malade s'en plaignit, un petit boudonnet que j'y enfilai chargé
d'une matière semblable à de la lie de vin et qui répandoit une
mauvaise odeur: je le nettoiai ^{avec} de nouveaux boudonnets et y
en laissai un imbibé de vin miellé arrosé d'un peu d'eau de vie
Camphrée.

Le lendemain je fis une injection avec le même mélange dans le canal et continuai pendant trois jours consécutifs, et au bout d'un jour, je perdis de vue le tibia à l'endroit de la fracture, parce qu'il commençait à être recouvert par les chairs voisines; il se formait à la partie supérieure et externe de la jambe une tumeur qui était un peu douloureuse, mais sans changement de couleur à la peau; je soupçonnai avec raison qu'il s'était au bout du péroné qui dans l'accident s'était cassé près de son col, et qui s'élevait en proportion de l'avancement du membre mais qui avait-il à faire dans une circonstance aussi grave?

Malgré le grand délabrement et l'abondante hémorrhagie, les pansemens étaient toujours très simples; je faisais faire de temps en temps de légers mouvements à la jambe et au pied. enfin le 26 jour le blessé était aussi bien qu'il pouvait être, ne ressentant plus de douleurs, et la plaie étant en bon état, je m'occupai sérieusement à contenir la jambe dans une extension qui pût supporter un grand raccourcissement et lui donner la meilleure conformation possible.

Je me servais à cet effet une machine que j'avais imaginée trois ans avant pour une fracture complète et compliquée de la jambe, avec issue de plus d'un pouce de la portion supérieure du tibia et de laquelle le blessé a été guéri complètement sans claudication ni difformité.

J'ai eu occasion de m'en servir cinq fois depuis avec le même succès.

Description de la machine

Cette machine est composée de quatre pièces principales. La 1^{re} est un bandage qui fait fonction de contre-extension, qu'on peut appeler genouillère, Agée se place circulairement à un pouce au dessous des condyles du fémur, de chaque partie latérale de laquelle part un circonvoye.



..... on si l'on veut épanchement sur la dure-mère
 vous voudrez bien vous rappeler que mon objet dans
 la mémoire, et que je soumet à votre jugement, est
 de vous exposer mon opinion sur la cause de certains
 accidents consécutifs, inopines, et très-fâcheux, qui
 surviennent à quelques fractures qu'on appelle simples,
 et que j'envisage de dépendre de l'altération de la moëlle:
 pour raison de quoi je propose dans ces cas d'ouvrir
 sur la fracture et de la séparer même pour donner
 issue à cette substance —

Ces circonstances sont à la vérité de



avec beaucoup de succès.

Cette machine dont il m'a paru que quelques uns n'avoient pas fait. L'objet, ne sert point à opérer la réduction de la fracture, la quelle réduction, ne doit être faite que par le chirurgien, le quel (avant de procéder) doit faire tenir le membre (par des aides intelligents) dans une situation légèrement fléchie; situation dont on seut après l'avantage; mais elle a été imaginée (cette machine) pour maintenir (la réduction étant faite) les bords fracturés dans le plus exact contact, sans aucune gêne, et ce pendant tout le cours de la cure; et pour rendre les pansements les plus simples, et les moins douloureux possible, surtout dans les fractures compliquées. c'est d'ailleurs ce que l'expérience m'a prouvé. par le moyen de cette machine le fléni &c

La 2^{ème} est un second bandage qui fait fonction d'extenseur, A qui se place aussi circulairement a la partie inférieure de la jambe au dessus de malléole, ayant derrière a chaque partie latérale un couvroir.

La 3^{ème} est une tige de fer poli de la grosseur du doigt, et longue de deux pieds terminée inférieurement en lambeaux, et par une vis qui doit recevoir un écrou à oreille, et supérieurement par une légère courbure à l'extrémité de laquelle se trouve un bouton. cette tige se place le long de la face externe de la jambe.

La 4^{ème} est une seconde tige semblable à la 1^{ère}, mais de deux pouces moins longue, A qui se place à la face interne de la jambe.





par le moyen de cette machine le blessé soutenait lui-même son
l'extension involontaire; j'observai toute fois quelle fut assez peu utile
pour produire l'effet désiré.

avec ces précautions il a conservé la jambe bien droite, mais
la pointe du pied servait son seul point d'appui; si elle portait
à son soutien un talon de 3 pouces $\frac{1}{2}$.

C'est je crois tout ce qu'on pouvait espérer d'une jambe qui
avait paru devoir être amputée.

C'est pas de la fois que cette opération (jugée nécessaire)
n'a cependant pas été faite à cause des accidents qui la contre-
indiquoient, et après la cessation des quels le malade a conservé
son membre; mais les succès qu'on a quel que fois obtenus contre
toute attente, ne doivent jamais être un vain raisonnement pour
s'écarter des préceptes fondés sur une expérience respectée.

aussi je ne donne pas cette observation pour les imiter, mais
que dans tous les cas ou les praticiens s'en sont servis, le plus
court délai est souvent devenu l'ôt d'un grand avantage.

Dans cette 4^e observation on reconnoît donc une de ces fractures
qui par leur complication, sembloient demander l'amputation
du membre, lequel cependant a été conservé, et le blessé a
guéri.

Les 3 premières, sont de celles qui paroissent simples, et
dont les accidents consécutifs ont fait périr les malades, et qui
auroient probablement guéri si on eût fait à temps cette
opération, ou au moins si on eût incisé sur la fracture, pour
les pièces pour donner un libre issue à la matière qui étoit
en fonte putride.

Mais quels sont les signes qui pourroient déterminer le kind
 -vargien à agir ainsi? je pense que lors que la fièvre le délive
 les convulsions, ou mouvements convulsifs principalement des muscles
 de la face, ^{et des lèvres les yeux inquiets, la parole brève} les frissons, une douleur aiguë et profonde qui s'étend
 dans la partie blessée survient, a une fracture réunie, et main-
 tenue réunie selon les règles de l'art (le blessé étant d'ailleurs
 d'une bonne constitution) je suis des signes très indiquants.
 mais il sera toujours prudent a un jeune praticien de
 s'étayer d'un bon conseil en pareil cas —

Fin —

65. xbre 1776//

Aumentand
 2eme